

E un copil. Din prima clipă!

- **Ziua 1:** Are loc fertilizarea ovulului de un spermatozoid. În pântecul mamei apare o nouă ființă umană, cu cod genetic (ADN) propriu și unic.
- **Săptămâna a 2-a:** Copilul se fixează de uterul mamei. Începe dezvoltarea sistemului nervos.
- **Săptămâna a 3-a:** Începe dezvoltarea vaselor de sânge. Se formează celulele sangvine și celulele care vor determina sexul copilului.
- **Săptămânile 4-7:** Începe să bată inima. Apar reflexele. Se formează ficatul, rinichii și plămânii.
- **La 8 săptămâni,** fiecare organ al corpului este prezent și funcțional.
- **Săptămânile 9-10:** Copilul își suge degetul, face tumbe
- **La 12 săptămâni:** Apar firele de păr. Copilul poate răspunde la atingeri. Are acum 9 cm și 45 de grame.



©Life Issues Institute

Poți primi ajutor

Sarcină nedorită? Nu te grăbi! Multe cupluri se confruntă cu situația unei sarcini neplanificate. Din grabă, rușine și din dorința de a scăpa de o „povară”, prima și uneori singura soluție la care cei doi se gândesc este avortul.

Însă o decizie luată în grabă poate avea consecințe devastatoare pentru viața ta. Noi îți putem sugera și alte variante, printr-un program de consiliere adresat special celor ca tine. Acordă-ți timp să afli mai multe. Contactează-ne!

Ai făcut un avort? Poți primi ajutor! Avortul poate lăsa urme adânci în mintea, în trupul unei femei și în relațiile ei sociale. Dacă te simți vinovată, tristă, dacă ai gânduri de sinucidere și vise urâte, dacă ai dificultăți de concentrare și pierderi de memorie, tulburări digestive, atacuri de panică, crize de plâns, coșmaruri, insomnii, dacă simți nevoia să vorbești cu cineva, nu ezita să ne contactezi.

ASOCIAȚIA "PRO-VITA"



pentru Născuți și Nenăscuți, Filiala București

Tel. 0728.673.673; fax 031 815.27.80

Web: www.provitabucuresti.ro

Pentru programare:

Roxana Goci, psiholog

Tel. 0744.982.925, vreausaafly@yahoo.com



CE IMPLICĂ UN AVORT ?

La fel ca la orice altă procedură medicală, ai dreptul să fii informată. Dacă te gândești să faci un avort, iată câteva lucruri pe care ar trebui să le știi:

- Cum s-a dezvoltat sarcina ta?
- Ce presupune un avort?
- Ce complicații pot apărea?

Proceduri de avort

Vacuum - aspirația

- × Între 6 și 14 săptămâni

Colul uterin, închis, este dilatat forțat. O chiuretă aspirantă (un tub cu găuri și cu vârf ascuțit, ca un cuțit) este introdusă în uter. O aspirație puternică produsă de o pompă electrică sau altă sursă de vacuum sfârteacă în bucăți corpul fătului. Uneori este necesară introducerea unui forceps pentru zdrobirea craniului copilului, structura lui fiind prea rigidă.

Pe această temă a fost realizat filmul documentar „Strigătul mut”. Filmul surprinde, cu ajutorul unui ecograf, procedura unui avort. În timpul avortului, se poate vedea cum copilul se ferește de aparatul care îl va omorî și cum deschide gura larg, ca un țipăt disperat în fața morții. Poți viziona filmul la www.provitatv.ro

Chiuretajul

- × Între 5 și 12 săptămâni

Se aseamăna avortului prin aspirație, dar în acest caz, după dilatarea forțată, corpul fătului este evacuat cu un instrument numit

chiuretă, extras în afara uterului, bucată cu bucată, împreună cu placenta și țesuturile.

Complicații ale avortului

Imediate sau pe termen scurt:

- infecții (de la minore la fatale), sângerări, febră, tulburări de digestie
- perforarea ori ruperea uterului, leziuni cervicale
- sterilitate (2-5% din avorturi)
- miros puternic al vaginului
- avort incomplet (sarcina se poate dezvolta în continuare în uter)

Pe termen lung:

- crește de 8 până la 20 de ori riscul unei sarcini extrauterine (risc grav pentru viața femeii)
- colul uterin devine incapabil să mai susțină greutatea unei sarcini, ducând la avorturi spontane sau nașteri premature
- risc crescut de cancer de sân sau de col

Efecte asupra psihicului:

- sentiment de culpă și tulburări de personalitate (sindromul post-avort)
- tulburări afective și sexuale
- depresie, lipsă de speranță, sentiment de inutilitate
- destrămarea relațiilor sociale
- sindromul „aniversării”

- psihoze de scurtă durată
- amintiri dureroase - retrăirea avortului
- atacuri de panică și crize de plâns
- dificultăți de asumare a maternității
- gânduri de sinucidere

Avortul și cancerul de sân

Un avort predispune femeia la cancer de sân. Un studiu efectuat în 1994 de către Universitatea Harvard asupra unui număr de 2.000 de femei din Grecia a descoperit că riscul de a dezvolta cancer de sân este cu 51% mai mare la femeile care au făcut un avort.

