

- A fost introdus recent în țara noastră; începând cu noiembrie 2008 se desfășoară prima campanie națională de vaccinare, la fete de 10-11 ani;
- Se comercializează **2 tipuri** de vaccin anti-HPV: **Cervarix** și **Gardasil** (3);

LA CINE APARE INFECȚIA CU HPV?

În mod sigur nu la fetele de 10-11 ani, vizate de campania Guvernului!

- Infecția cu virusul HPV apare la femeile active sexual, nu la fetițe!
- Obiceiurile sexuale sunt un factor determinant în infecția cu HPV (9).

CÂND APARE CANCERUL DE COL UTERIN?

- Acest cancer apare după infecția cu virusul HPV (unul din tipurile oncogene) pe un „col uterin receptiv” -adică **deja afectat de boli cu transmitere sexuală** (gonoree, candidoză, trichomoniază)-precum și de alți factori favorizanți precum fumatul (7);
- Leziunile produse la nivelul colului uterin vor determina o modificare la nivelul genelor oncogene, provocând formarea cancerului; aceste modificări pot fi produse și de către **contraceptive orale** precum și alți factori mai puțin cunoscuți (8);
- Progresia de la infecția inițială la leziunile preinvazive și, ulterior, cancer invaziv (cancer în fază tardivă), necesită o

perioadă de chiar și 10 ani sau mai mult (10).

CÂT DE EFICIENT E VACCINUL?

Nu se știe încă!

- În momentul de față **nu există încă date care să dovedească eficiența vaccinării anti-HPV în prevenția cancerului invaziv**. Va trece încă destul timp până când astfel de date vor deveni disponibile, pentru că **vaccinul se utilizează pe plan mondial de doar câțiva ani**, în timp ce perioada de la infectarea cu HPV până la apariția cancerului invaziv este frecvent de peste 10 ani (11);
- Din același motiv, există prea puține date inclusiv despre efectele pe termen lung ale acestui vaccin (12).

CE ȘTIM SIGUR DESPRE VACCIN?

- Că vaccinul nu vindecă o infecție deja existentă! (4);
- Că are **efecte secundare!**

CARE SUNT EFECTELE SECUNDARE?

- mâncărime, roșeață sau durere la locul injecției, febră, grețuri;
- șoc anafilactic și epilepsie;
- paralizii;
- atacuri de panică și tulburări circulatorii;
- stare de rău, dureri de cap și de spate;
- căderea părului și amenoree secundară (lipsa menstruației);

- tulburări de sensibilitate, dureri articulare, erupții pe piele, oboseală accentuată, amețeli;
- lipsa poftei de mâncare, depresie;
- amețeli, tremurături, paretezii (senzație de arsură) la picioare și la față;
- meningită virală;
- deces (14, 17).

Până în iunie 2008, în SUA erau înregistrate aproape 9.000 de efecte adverse, inclusiv 10 pierderi de sarcină (17).

CAZURI MORTALE: În SUA s-au raportat 25 de decese posibil asociate cu Gardasil (16). Alte două decese suspecte s-au constatat în Germania și Austria (15).

Din aceste motive, noi nu încurajăm vaccinarea. Decizia vă aparține.

DE CE ESTE GREȘITĂ ACEASTĂ PREVENȚIE (VACCINAREA)?

- Premizele de la care se pleacă pentru prevenirea cancerului de col sunt greșite; se crede că vaccinul va rezolva totul și nu se iau în considerare cauzele directe ale infecției și bolii: **relațiile sexuale de la o vârstă fragedă; partenerii multipli; contractarea bolilor cu transmitere sexuală (gonoree, etc.); fumatul; folosirea contraceptivelor orale, etc. Toți acești factori favorizează producerea cancerului de col uterin.**
- În locul eliminării cauzelor, **riscăm să ne îmbolnăvim copiii** (fetele) administrându-le

un vaccin încă insuficient testat și mai ales cu multe efecte secundare.

DACĂ NU MĂ VACCINEZ, CUM MĂ POT APĂRA DE CANCER?

- **Evitați factorii favorizanți** de mai sus;
- Efectuați **Testul Babeș-Papanicolau** de două ori pe an, dacă ați început activitatea sexuală (16).

DE CE NUMIȚI VACCINAREA “EXPERIMENT PERICULOS”?

Pentru că vaccinul HPV nu este pe deplin testat, evaluarea sa urmând să se încheie în sept. 2009 (16). Copiii dvs. au fost aleși să fie „cobai”.

DE CE AR APROBA GUVERNUL ADMINISTRAREA UNUI VACCIN INSUFICIENT TESTAT?

Pentru că „este vorba despre bani”. Marile concerne farmaceutice acordă comisioane importante distribuitorilor de medicamente și nu ar fi prima dată când statul lezează interesele cetățenilor, preferându-le pe cele ale afaceriștilor.

CUM ÎMI POT FERI COPIII DE ACEST VACCIN?

Orice părinte are **dreptul de a refuza vaccinarea copilului** său, semnând o declarație pe propria răspundere. Nici un vaccin nu poate fi administrat “obligatoriu”.

Bibliografie:

- 1), 4), 12), 16). Dr. Christa Todea Gross. *Îndrumarul Federației Organizațiilor Ortodoxe Provita din România. Editura Renașterea, Cluj 2008, p. 331-335;*
- 7), 8). Dr. Traian Ciucă. *Boli transmisibile pe cale sexuală. Editura Științifică, București, 1993, p. 59, 66;*
- 3), 10), 11). <http://medic.pulsmedia.ro/>
- 9). Dr. Genoveva Tudor. *Bolile Homosexualilor - Un documentar medical la zi, Editura Christiana, Bucuresti 2005, pp. 102-103.*
- 14). http://www.sanego.de/Medikament_Gardasil
- 15). Hans U. P. Tolzin, <http://www.impf-report.de>
- 16). <http://www.judicialwatch.org/documents/2008/JWReportFDAhpvVaccineRecords.pdf>
- 17). http://www.judicialwatch.org/documents/2008/Gardasil_VAERS_All.pdf

Mai multe informații la
www.provitabucuresti.ro

ASOCIAȚIA “PRO-VITA”



pentru născuți și nenăscuți
Filiala București

O.P. 1 – C.P. 410

Tel. 0728.673.673; fax 031 815.27.80

E-mail: provitabucuresti@yahoo.com

Web: www.provitabucuresti.ro

DACĂ AVEȚI COPII SAU INTENȚIONAȚI SĂ AVEȚI, ACEST PLIANT VĂ PRIVEȘTE!



VACCINUL “ANTICANCER”

UN EXPERIMENT PERICULOS!

CE ESTE VACCINUL “ANTICANCER DE COL UTERIN”?

- Un vaccin cu **scopul declarat de a preveni infecția cu virusul HPV** (papilomavirusul uman, care poate duce la cancer de col uterin) (1);